



Gebruiksaanwijzing

Bij het verzamelen van de ochtendurine met de urine-monovette vragen wij u als volgt te werk te gaan. U helpt ons daarmee om in het laboratorium tot zo nauwkeurig en onvervalst mogelijke resultaten te komen.

A. Is uw testset compleet?

Controleer eerst of uw testset compleet is:

1 x urinebuisje (monovette) met teksveld en gele opzuignaald

1 x lekvrije sealbag met vliesdoekje

B. Opvangen van de ochtendurine

a. Neem het monster van uw **tweede ochtendurine**. Let erop dat u minimaal 8 uur niets meer heeft gegeten.

b. Gebruik de middenstraalurine voor vult u een schone plastic beker met urine. Het urinebeker dient ongeveer half vol te zijn. De rest urineert u weer in het toilet.

c. Pak nu de gele opzuignaald en het gele urinebuisje, schroef het gele dopje er af en bevestig de naald.

d. Dompel de gele naald in de urine en zuig nu met dit buisje een deel van de urine op uit het urinepotje door de stamper achter volledig uit te trekken. Het urinebuisje moet volledig worden gevuld.

e. Verwijder de gele naald en sluit het urinebuisje met de gele dop zorgvuldig.

f. De stamper op de aangegeven plaats afbreken, zodat de rest van de stamper niet meer uitsteekt.

g. Doe het urinebuisje in de lekvrije sealbag met vliesdoekje en sluit dit zorgvuldig.

h. Doe de naald, de afgebroken stamper en het urinepotje bij het huisvuil.



LET OP: Graag uitsluitend versturen op maandag, dinsdag of woensdag!